

Tabelle 5: Artenliste Avifauna

Spalte 1: Vogelschutz-Richtlinie

- I Anh I der Vogelschutzrichtlinie
- Z Zugvogelart nach Art. 4, Abs. 2 VRL, für die in Bad.-Württ. Schutzgebiete ausgewiesen wurden

Spalte 2 : Schutzstatus in Deutschland

- alle europäischen Vogelarten sind *besonders geschützt* (§10 BNatSchG mit Bezug zu Art. 1 VRL)
- A im Anhang A der EG-VO 338/97 streng geschützt
- §§ streng geschützt nach BArtSchV

Spalte 3-4: Rote Liste Deutschland (3), Baden-Württemberg (4) (Grünberg et al (2015), Bauer et al (2016))

- V - Vorwarnliste 3 - gefährdet 2 - stark gefährdet 1 - vom Aussterben bedroht
- 0- ausgestorben R -Arten mit geographischer Restriktion

Spalte 5: Häufigkeit als Brutvogel in Baden-Württemberg (Bauer et al 2016)

- ex ausgestorben oder verschollen
- es extrem selten (weniger als 5 Vorkommen bei spezieller Biotopbindung)
- ss sehr selten (1-100 Brutpaare)
- s selten (101-1000 Brutpaare)
- mh mäßig häufig (1001-10.000 Brutpaare)
- h häufig (10.001-100.000 Brutpaare)
- sh sehr häufig (> 100.000 Brutpaare)

Statusangaben

- B – wahrscheinlicher Brutvogel mit Anzahl der Reviere des EOAC-Code B oder höher
- A – möglicher Brutvogel, EOAC-Code A, ggf. mit Anzahl der Reviere
- S - wahrscheinlicher Brutvogel mit halbquantitativer Schätzung der Anzahl Brutreviere
- Brv - wahrscheinlicher Brutvogel ohne Angabe von Status und Menge (Beibeobachtung in TG 5 und 6)
- pB - Habitatpotential vorhanden, Bruten nicht ausgeschlossen (kein Nachweis bei vorliegender Kartierung)
- ng – Nahrungsgast nz- Nahrungsgast auf dem Durchzug dz- Durchzügler
- pn- potentieller Nahrungsgast (kein Nachweis bei vorliegender Kartierung)

Hinweise:

- Die Lage der Teilgebiete Nr. 1 bis 6 ist der Karte 1 in der Übersichtskarte auf Seite 5 zu entnehmen.
- Für die Teilgebiete 1-4 (Dietenbachniederung und Langmattenwäldchen) wird die Anzahl der Brutreviere angegeben (Revierkartierung für wertgebende Arten, halbquantitative Schätzung für übrige Arten, siehe Kap. 2. Seite 6)
- Im Teilgebiet 5 wurden nur störungsempfindliche Arten systematisch kartiert. Die Tabelle enthält auch Zufallsbeobachtungen weiterer Arten in diesem Teilgebiet und Zufallsbeobachtungen von Brutvogelarten im Teilgebiet 6.
- Die Zuordnung zur Kategorie Nahrungsgast erfolgt auch für Teilgebiete, in denen keine konkrete Beobachtung erfolgte, sofern eine Nutzung dieses Bereiches anhand der vorhandenen Strukturen plausibel erscheint und die Art im Gesamt-UG nachgewiesen wurde.
- Zur Ermittlung der Anzahl der Reviere siehe Kap. 2b

Anmerkungen:

- 1) Brutvogel am Mundenhof
- 2) Vermutlich Brutvogel am Mundenhof
- 3) Die Beobachtungen im Jahr 2015 entsprechen EOAC-Code B (wahrscheinliches Brüten), jedoch fand in diesem Jahr nachweislich keine erfolgreiche Brut statt

1	2	3	4	5	Artnamen	Dietenbachniederung			Langmat-	Fronholz	
						1	2	3	tenwäld.	5	6
V	A	D	B	H	Artnamen	1	2	3	4	5	6
Brutvögel Dietenbachniederung in 2015											
				h	Bachstelze (Motacilla alba)	B- 1	ng	ng			
Z	A	3	V	s	Baumfalke (Falco subbuteo)	ng	ng	B-1 ³⁾	ng	ng	ng
				sh	Buchfink (Fringilla coelebs)	S- 7	ng	S- 5	S- 40	Brv	Brv
				h	Dorngrasmücke (Sylvia communis)	B- 1 A- 3		B- 1			
		3	3	h	Feldlerche (Alauda arvensis)	B- 1 A- 1		ng			
				sh	Gartengrasmücke (Sylvia borin)	S- 2		S- 8			
				h	Girlitz (Serinus serinus)	B- 0,5		A- 1	B- 2 A- 1		

1	2	3	4	5	Artnamen	Dietenbachniederung			Langmat- tenwäld.	Fronholz	
						1	2	3	4	5	6
V	A	D	B	H	Artnamen						
		V	V	h	Goldammer (<i>Emberiza citrinella</i>)	B- 5 A- 3	A- 1	B- 3 A- 1			
		V	V	h	Grauschnäpper (<i>Muscicapa striata</i>)	B- 1	B- 1	B- 1	B- 2	B- 1	
				sh	Grünfink (<i>Carduelis chloris</i>)	S- 1	ng	ng	S- 4		
				sh	Hausrotschwanz (<i>Phoenicurus ochruros</i>)	S- 1					
		V	V	sh	Hausperling (<i>Passer domesticus</i>)	S- 20					
				sh	Mönchsgrasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)	S- 3		S- 12	S- 25	Brv	Brv
				mh	Nachtigall (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	S- 1			S- 2		
I				h	Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>)	B- 1		B- 1			
Z			V	s	Schwarzkehlchen (<i>Saxicola Torquata</i>)	B- 1	ng	A-1			
		3		sh	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	A- 1	B- 1	A- 2	S- 30	S- 10	Brv
			V	h	Stockente (<i>Anas platyrhynchos</i>)	ng	ng	S- 1			
				h	Sumpfschneise (<i>Parus palustris</i>)			S- 1	S- 1	Brv	Brv
				h	Sumpfrohrsänger (<i>Acrocephalus palustris</i>)			B- 1			
	A		V	mh	Turmfalke (<i>Falco tinnunculus</i>)	ng	ng	B- 1³⁾			
	A			mh	Waldohreule (<i>Asio otus</i>)	B- 1	ng	ng	pB	pB	
				sh	Zaunkönig (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	S- 2	S- 1	S- 5	S- 12	Brv	Brv
Zusätzliche Brutvögel Langmattenwäldchen in 2015											
				sh	Amsel (<i>Turdus merula</i>)	ng	ng	ng	S- 45	Brv	Brv
				sh	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)				S- 15	Brv	Brv
				h	Buntspecht (<i>Dendrocopos major</i>)	ng		ng	B- 4	B-3	Brv
				h	Gartenbaumläufer (<i>Certhia brachydactyla</i>)				S- 6	Brv	Brv
	§§			mh	Grünspecht (<i>Picus viridis</i>)				B- 1	B- 1	B- 1
				h	Kernbeißer (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)			ng	S- 1	Brv	Brv
				sh	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)				S- 5	Brv	Brv
		V	V	mh	Kleinspecht (<i>Dendrocopos minor</i>)				B- 1	B- 1	
				sh	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)				S- 15	Brv	Brv
	A			h	Mäusebussard (<i>Buteo buteo</i>)	ng	ng	ng	B- 1	B- 2	
I	§§			mh	Mittelspecht (<i>Dendrocopos medius</i>)		ng		B- 1	B- 3,5	B- 2,5 A - 1
				h	Rabenkrähe (<i>Corvus corone</i>)	ng	ng	ng	S- 4	Brv	Brv
				sh	Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)	ng	ng	ng	S- 2	Brv	Brv
				sh	Rotkehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)				S- 30	Brv	Brv
				h	Schwanzmeise (<i>Aegithalos caudatus</i>)				S- 1	Brv	Brv
				sh	Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)	ng	ng	ng	S- 30	Brv	Brv
				sh	Sommersgoldhähnchen (<i>Regulus ignicapillus</i>)				S- 2	Brv	Brv
				sh	Zilpzalp (<i>Phylloscopus collybita</i>)				S- 25	Brv	Brv
Zusätzliche Brutvögel Fronholz in 2015											
	A			mh	Habicht (<i>Accipiter gentilis</i>)					ng	B- 1
		V	2	mh	Kuckuck (<i>Cuculus canorus</i>)				A- 1	B- 1	
		V	3	mh	Pirol (<i>Oriolus oriolus</i>)					B- 1	
I	A			mh	Schwarzmilan (<i>Milvus migrans</i>)	ng	ng	ng		B- 1³⁾	
I	§§			mh	Schwarzspecht (<i>Dryocopus martius</i>)				ng	B- 0,5	B- 0,5
Weitere mögliche Brutvögel ohne gesicherten Nachweis in 2015 (EOAC Code A und Arten für die ein Habitatpotential vorhanden ist).											
				h	Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	ng	ng	ng	A- 1	A	A
I	§§		V	s	Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>)		ng	ng,pB		A- 1	A- 1
				mh	Gebirgsstelze (<i>Motacilla cinerea</i>)					A- 1	
I	§§	2	2	mh	Grauspecht (<i>Picus canus</i>)				pB	pB	pB

1	2	3	4	5	Artnamen	Dietenbachniederung			Langmat- tenwäld.	Fronholz	
						1	2	3	4	5	6
V	A	D	B	H	Artnamen	1	2	3	4	5	6
Z			V	mh	Hohлтаube (<i>Columba oenas</i>)	ng	ng	ng		pB	pB
	A			mh	Sperber (<i>Accipiter nisus</i>)	ng	ng	ng	ng	ng	A- 1
				h	Stieglitz (<i>Carduelis carduelis</i>)	ng	ng	ng	A- 1		
Z		V	V	mh	Wachtel (<i>Coturnix coturnix</i>)	pB					
	A			mh	Waldkauz (<i>Strix aluco</i>)				A- 1	A- 2	
		V	V	mh	Waldschnepfe (<i>Scolopax rusticola</i>)					pB	pB
Nahrungsgäste Dietenbachniederung und Langmattenwäldchen											
		R		s	Alpensegler (<i>Apus melba</i>)	ng	ng	ng	ng	ng	ng
		3	2	mh	Bluthänfling (<i>Carduelis cannabina</i>)	ng	ng	ng			
		V	V	h	Feldsperling (<i>Passer montanus</i>)	ng		ng			
				h	Gimpel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)				ng		
				mh	Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)	ng	ng	ng			
					Jagdfasan (<i>Phasianus colchicus</i>)	ng	ng	ng	ng		
			V	h	Mauersegler (<i>Apus apus</i>)	ng	ng	ng	ng	ng	ng
		3	V	h	Mehlschwalbe (<i>Delichon urbica</i>)	ng	ng	ng	ng	ng	ng
	A				Nilgans (<i>Alopochen aegyptiacus</i>)	ng		ng			
		3	3	h	Rauchschwalbe (<i>Hirundo rustica</i>)	ng	ng	ng	ng	ng	ng
I	A	V		mh	Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>)	ng	ng	ng			
				mh	Saatkrähe (<i>Corvus frugilegus</i>)	ng	ng	ng			
	A			mh	Schleiereule (<i>Tyto alba</i>) ²⁾	pn		pn			
I	A				Silberreiher (<i>Egretta alba</i>)	ng	ng	ng			
I	A			s	Wanderfalke (<i>Falco peregrinus</i>)	ng	ng	ng			
I	§§	3	V	s	Weißstorch (<i>Ciconia ciconia</i>) ¹⁾	ng	ng	ng			
I	A	3		s	Wespenbussard (<i>Pernis apivorus</i>)	ng	ng	ng	ng		pB
				sh	Wintergoldhähnchen (<i>Regulus regulus</i>)					ng	
Durchzügler Dietenbachniederung und Langmattenwäldchen											
Z		2	1		Braunkehlchen (<i>Saxicola rubetra</i>)	nz	nz	nz			
					Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)				nz		
		3	2		Feldschwirl (<i>Locustella naevia</i>)				nz		
			3		Fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>)		nz			nz	
		V	V		Gartenrotschwanz (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	nz					
Z	§§	2	1		Kiebitz (<i>Vanellus vanellus</i>)	nz					
					Kolkrabe (<i>Corvus corax</i>)		dz	dz	dz	dz	dz
		2	1		Wiesenpieper (<i>Anthus pratensis</i>)	nz		nz			
Z			V		Wiesenschafstelze (<i>Motacilla flava</i>)	nz		nz			
Nahrungsgäste und Durchzügler, die nur im Rieselfeld beobachtet wurden.											
		3	2		Baumpieper (<i>Anthus trivialis</i>)						
Z	§§	1	1		Bekassine (<i>Gallinago gallinago</i>)						
					Dohle (<i>Corvus monedula</i>)						
					Elster (<i>Pica pica</i>)						
	§§		V		Flussregenpfeifer (<i>Charadrius dubius</i>)						
I	§§	V	1		Heidelerche (<i>Lullula arborea</i>)						
					Kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)						
Z		3	1		Krickente (<i>Anas crecca</i>)						
					Reiherente (<i>Aythya fuligula</i>)						
Z			1		Ringdrossel (<i>Turdus torquatus</i>)						
					Waldwasserläufer (<i>Tringa ochropus</i>)						